

# Počasí v Plzeňském a Karlovarském kraji v prosinci 2022



V měsíci prosinci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota  $0.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ , což představuje odchylku  $+0.7\text{ }^{\circ}\text{C}$  od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020 (teplotně normální). Průměrně spadlo  $48.2\text{ mm}$  srážek, což představuje  $93.1\%$  dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020 (srážkově normální). V Karlovarském kraji dosáhla v prosinci průměrná měsíční teplota  $-0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , což představuje odchylku  $+0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$  od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020 (teplotně normální). Průměrně spadlo  $50.6\text{ mm}$  srážek, což představuje  $78.5\%$  dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020 (srážkově normální).

## Plzeňský kraj

V měsíci prosinci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota  $0.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ , což představuje odchylku  $+0.7\text{ }^{\circ}\text{C}$  od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity **teplot** můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyšší průměrné měsíční teploty  $1.4\text{ }^{\circ}\text{C}$  bylo dosaženo na stanici Klatovy, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou  $1.3\text{ }^{\circ}\text{C}$  a na třetí příčce se umístil Staňkov s teplotou  $1.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou  $-2.4\text{ }^{\circ}\text{C}$ , druhé místo obsadila Přimda s teplotou  $-0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$  a na třetí příčce se umístily Konstantinovy Lázně s teplotou  $-0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 31. prosince  $16.9\text{ }^{\circ}\text{C}$  na stanicích Klatovy a Plzeň – Bolevec, o druhé místo se dělí stanice Plzeň – Mikulka a Vlkonice (31. 12.) s teplotou  $16.7\text{ }^{\circ}\text{C}$  a na třetí příčce se umístil Staňkov s teplotou  $16.4\text{ }^{\circ}\text{C}$  (31. 12.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 13. prosince  $-25.2\text{ }^{\circ}\text{C}$  na Horské Kvildě, druhé místo obsadily Vlkonice s teplotou  $-18.3\text{ }^{\circ}\text{C}$  (18. 12.) a na třetí příčce s teplotou  $-18.1\text{ }^{\circ}\text{C}$  se umístil Nepomuk (18. 12.).

V Plzeňském kraji spadlo v prosinci průměrně  $48.2\text{ mm}$  srážek, což představuje  $93.1\%$  dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity **srážek** můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu  $151.1\text{ mm}$  bylo dosaženo v Prášilech, druhé místo obsadil Špičák s úhrnem  $128.2\text{ mm}$  a na třetí příčce se umístila Hojsova Stráž s úhrnem  $122.0\text{ mm}$ . Naopak nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán v Liblíně  $23.2\text{ mm}$ , druhé místo obsadily Plasy s úhrnem  $26.4\text{ mm}$  a na třetí příčce se umístil Terešov s úhrnem  $27.4\text{ mm}$ . Nejvyšší denní úhrn srážek  $38.0\text{ mm}$  byl zaznamenán 22. prosince v Prášilech, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s úhrnem  $30.7\text{ mm}$  (22. 12.) a na třetí příčce se umístil Špičák s úhrnem  $30.1\text{ mm}$  (22. 12.).



Nejvíce sněhu napadlo v Srní s celkovým měsíčním úhrnem 41 cm, dále na Horské Kvildě 37 cm a v Prášilech 36 cm. Maximální výška sněhové pokrývky 35 cm byla naměřena 17. prosince ve Filipově Huti, dále 26 cm na Horské Kvildě (17. 12.) a 24 cm v Prášilech (17. 12.). Největší denní úhrn sněhu 12 cm byl zaznamenán 5. prosince na Horské Kvildě, dále 11 cm na stanicích Srní (5. 12.) a Životice (11. 12.) a 10 cm na stanicích Filipova Huť (5. 12.), Nepomuk a Žinkovy (11. 12.).

Doba **trvání slunečního svitu** v regionu byla v průměru 35.3 h, což odpovídá 120.9 % dlouhodobého průměru 1991 – 2020 a měsíc lze tedy hodnotit jako **normální**.

## Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dosáhla v prosinci průměrná měsíční teplota  $-0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , což představuje odchylku  $+0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$  od dlouhodobého teplotního průměru 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity **teplot** můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyšší průměrné měsíční teploty  $1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$  bylo dosaženo v Karlových Varech, druhé místo obsadil Sokolov s teplotou  $0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$  a na třetí příčce se umístila stanice Cheb s teplotou  $0.6\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nejchladnější stanicí byl Klínovec s průměrnou měsíční teplotou  $-3.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ , druhé místo obsadilo Jelení u mostu s teplotou  $-2.4\text{ }^{\circ}\text{C}$  a třetí nejchladnější byla Dyleň s teplotou  $-1.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Nejvyšší maximální denní teplota byla naměřena 31. prosince  $15.8\text{ }^{\circ}\text{C}$  v Karlových Varech, druhé místo s teplotou  $15.7\text{ }^{\circ}\text{C}$  obsadil Sokolov (31. 12.) a na třetí příčce se umístil Cheb s teplotou  $14.6\text{ }^{\circ}\text{C}$  (31. 12.). Nejnížší minimální denní teplotu naměřili meteorologové dne 18. prosince a to  $-27.8\text{ }^{\circ}\text{C}$  na stanici Jelení u mostu, druhé místo obsadila Šindelová s teplotou  $-18.4\text{ }^{\circ}\text{C}$  (18. 12.) a na třetí příčce se umístil Nejdek s teplotou  $-15.8\text{ }^{\circ}\text{C}$  (18. 12.).

V měsíci prosinci spadlo v Karlovarském kraji průměrně 50.6 mm srážek, což představuje 78.5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020. Podle klasifikace extremity **srážek** můžeme měsíc charakterizovat jako **normální**. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 89.6 mm bylo dosaženo v Přebuzi, druhé místo obsadil Nejdek s úhrnem 77.6 mm a na třetí příčce se umístily Abertamy s úhrnem 72.4 mm. Naopak nejnížší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán ve Žluticích 35.7 mm, které jsou následovány stanicemi Cheb s úhrnem 36.5 mm a Krásné Údolí s úhrnem 36.8 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 21.4 mm byl zaznamenán 22. prosince v Nejdku, druhé místo obsadila Přebuz s úhrnem 19.4 mm (22. 12.) a na třetí příčce se umístily Abertamy s úhrnem 19.3 mm (22. 12.).

Nejvíce sněhu napadlo na Klínovci s celkovým měsíčním úhrnem 43 cm, dále v Abertamech 24 cm a na třetí příčce s 20 cm se umístila Aš. Maximální výška sněhové pokrývky 30 cm byla naměřena 15. prosince na Klínovci, dále 15 cm na Přebuzi (12. 12.) a 13 cm v Abertamech (12. 12.). Největší denní úhrn sněhu 8 cm byl zaznamenán 7. prosince na Klínovci, dále 6 cm v Abertamech (7. 12.) a 5 cm ve Žluticích (2. 12.).

Doba **trvání slunečního svitu** v regionu byla v průměru 28.0 h, což odpovídá 90.4 % dlouhodobého průměru 1991 – 2020 a měsíc lze tedy hodnotit jako **normální**.

## Kontakt

**Karel Sklenář**

karel.sklenar@chmi.cz

**Pavel Vacík**

pavel.vacik@chmi.cz


**Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň**

## Přiložené mapy

1. Průměrná měsíční teplota vzduchu v prosinci 2022
2. Dlouhodobý průměr teploty vzduchu v prosinci (1991-2020)
3. Odchylka teploty od dlouhodobého průměru v prosinci 2022
4. Měsíční úhrn srážek v prosinci 2022
5. Dlouhodobý průměr srážkového úhrnu v prosinci (1991-2020)
6. Měsíční úhrn srážek ve srovnání s DP v prosinci 2022
7. Srovnání měsíčního úhrnu srážek s DP v prosinci 2022

# Průměrná měsíční teplota vzduchu v prosinci 2022


Český  
hydrometeorologický  
ústav



Český  
hydrometeorologický  
ústav

# Dlouhodobý průměr teploty vzduchu v prosinci (1991-2020)

Český  
hydrometeorologický  
ústav




Český  
hydrometeorologický  
ústav



# Odchyłka teploty od DP (1991-2020) v prosinci 2022


Český  
hydrometeorologický  
ústav



Český  
hydrometeorologický  
ústav

# Měsíční úhrn srážek v prosinci 2022


Český  
hydrometeorologický  
ústav



Český  
hydrometeorologický  
ústav

# Dlouhodobý průměr srážkového úhrnu v prosinci (1991-2020)

Český  
hydrometeorologický  
ústav




Český  
hydrometeorologický  
ústav



# Měsíční úhrn srážek ve srovnání s DP v prosinci 2022


Český  
hydrometeorologický  
ústav



Český  
hydrometeorologický  
ústav

# Srovnání měsíčního úhrnu srážek s DP v prosinci 2022

Český  
hydrometeorologický  
ústav



Český  
hydrometeorologický  
ústav